

BDH-Ausstattungsempfehlung

Hebammenkoffer/Gebrauchskoffer

- ❖ Hörrohr, Dopton oder CTG
- ❖ Blutdruckgerät
- ❖ Irrigator/Klistier
- ❖ Evtl. Nierenschale
- ❖ Stauschlauch
- ❖ Steriles Nabelbesteck:
2 x Kocherklemme, Nabelschere, Epi-Schere, Kompressen
- ❖ Steriles Nahtbesteck: Nadelhalter, gebogene Schere, 2 x Kocherklemme, anatomische und chirurgische Pinzette
- ❖ Babywaage
- ❖ Maßband
- ❖ Stethoskop (Kinderstethoskop)
- ❖ Taschenlampe
- ❖ *Uhr mit Sekundenzeiger*
- ❖ *Fieberthermometer*
- ❖ *Telefonliste jederzeit greifbar*
- ❖ *Kuli*

Verbrauchsmaterialien

- ❖ Einmal-Absauger
- ❖ Einmal-Nabelklemme
- ❖ Weiche sterile Kompressen (z.B. Topper 8)
- ❖ Sterile und unsterile Handschuhe (davon 1 Paar Latexhandschuhe)
- ❖ Krankenunterlagen
- ❖ Sterile Blasenkateter, lang und kurz
- ❖ Sterile Tücher (als Unterlage z. Nähen/Katherisieren)
- ❖ Sterile Kompressen, Tupfer
- ❖ Maustupfer (für Scheide)
- ❖ Nahtmaterial (atraumatischer Faden in 2 Größen)
- ❖ *Blutröhrchen (Nabelschnurblut) zu beziehen über das Labor*
- ❖ Tücher für den Damm (oder Waschlappen)

Die rot aufgeführten Sachen sind möglichst von den Eltern bzw. dem Labor zur Verfügung zu stellen.

Notfallausrüstung

- ❖ Sauerstoff-Gerät (O₂-Flasche mit Druckminderer, Beatmungsbeutel, Beatmungsmasken Gr. 00 und 01, Verbindungsschläuche)
- ❖ Infusionsbesteck
- ❖ Braunülen/Braunülenpflaster/
Stauschlauch
- ❖ 500 ml Sterofundin oder NaCl 0,9%
- ❖ evtl. 500 ml Plasmaexpander
- ❖ Spritzen/Kanülen
- ❖ Guedeltubus/ Mundkeil

Medikamente

- ❖ Syntocinon-Ampullen, 3 I.E., 10 I.E.
- ❖ Methergin-Ampullen
- ❖ Syntometrin-Ampullen
- ❖ Partusisten Intrapartal / evtl. Berotec-Spray
- ❖ Konakion-Tropfen
- ❖ Lokal-Anästhetikum (Meaverin 1%)
- ❖ Desinfektionsmittel (Schleimhaut und Haut)

Weiteres nach persönlichen Vorlieben
(Homöopathika, Rescue Remedy, ätherische Öle, Akupunkturnadeln, etc.)